PLANILLA DE SONDEO DE SÍSTEMAS



| Paciente Doctor | Fecha |
|--|--|
| Fecha de nacimiento / / Peso aproximado | Sexo: Masculino · · Femenino · · |
| Pulso: Recostado(a) De pie | Vegetariano: Sí · · No · · |
| · / ——————————————————————————————————— | |
| Tensión arterial: Recostado(a) / De pie | / La prueba de Ragland ** |
| INSTRUCCIONES: Rellene solo los círculos que se aplican a usted. | 1 2 3 |
| ● O O Síntomas LEVES (ocurre raramente) | 53 O O O Desea dulces o café en las tardes |
| ○ ● ○ Síntomas MODERADOS (ocurre varios veces al mes) | 54 O O O Humor de abatimiento- "depresión", o melancolía |
| ○ O Síntomas AGUDOS (ocurre casi constantemente) ○ O Deje en BLANCO los círculos que se no aplican a usted. | 55 O O O Un deseo intenso atípico de dulces o bocadillos (snacks) |
| Deje en BEANCO los circulos que se no aplican a usteu. | GRUPO 4 56 O O O Se le duermen las manos y pies fácilmente, entumecimiento |
| 1 2 3 GRUPO 1 | 57 O O Suspira frecuentemente, "hambriento de aire" |
| 1 O O O Malestar por alimentos ácidos | 58 O O O Consciente de que "respira pesadamente" |
| 2 0 0 0 Con frecuencia le dan escalofríos | 59 O O O Las grandes alturas le causan malestar |
| 3 ○○○ "Siente un nudo" en la garganta 4 ○○○ Boca-ojos-nariz seca | 60 O O O Abre las ventanas en cuartos encerrados 61 O O O Sensible a resfriados y fiebres |
| 5 O O O El pulso se acelera después de las comidas | 62 O O "Bostezador" en las tardes |
| 6 O O O Agitada(o) no puede calmarse | 63 O O O Se "adormece" con frecuencia |
| 7 O O O Las cortaduras sanan despacio | 64 O O O Se le hinchan los tobillos, aún más en la noche |
| 8 O O O Le dan náuseas fácilmente | 65 OOO Calambres musculares, se empeoran durante el ejercicio, le dan calambres o "charley horses" |
| 9 O O No puede relajarse; se sobresalta fácilmente | 66 OOO Falta de respiración cuando se esfuerza en exceso |
| 10 O O O Las extremidades frías, sudorosas 11 O O O Le irrita la luz fuerte | 67 OOO Un dolor sordo en el pecho o que se difunde al brazo |
| 12 O O O Micción reducida | izquierdo, se agrava con esfuerzo excesivo |
| 13 O O O El corazón le palpita fuerte después de irse a la cama | 68 O O O Le dan fácilmente moretones, "cardenales" |
| 14 O O O Un estómago "nervioso" | 69 O O O Tiene tendencia a la anemia 70 O O O Tiene con frecuencia "hemorragia nasal" |
| 15 OOO Falta de apetito | 71 O O O Siente ruidos en la cabeza, "zumbido en el oído" |
| 16 O O Con frecuencia tiene sudores fríos | 72 O O O Tensión bajo el esternón, o siente opresión, aún más |
| 17 O O O Fiebre se eleva con rapidez | cuando hace un esfuerzo excesivo |
| 18 O O O Dolores como de neuralgia | GRUPO 5 |
| 19 ○ ○ ○ Mirada fija, parpadea poco 20 ○ ○ ○ Con frecuencia acidez en el estómago | 73 O O O Mareos |
| GRUPO 2 | 74 O O O Piel seca |
| 21 0 0 0 Rigidez en los músculos al levantarse | 75 O O O Pies irritados (resquemados) 76 O O O Visión nublada |
| 22 O O O Calambres en los músculos-pierna-dedos en la noche | 77 O O O Comezón en la piel y en los pies |
| 23 OOO Un estómago con "mariposas", cólicos | 78 O O O Caída del cabello en exceso |
| 24 O O O Ojos lagrimosos o nariz acuosa | 79 O O O Frecuente sarpullido en la piel |
| 25 O O O Parpadeo frecuente 26 O O O Párpados inflamados, hinchados | 80 O O O Sabor amargo en la boca, a metal en las mañanas 81 O O O Deposición dolorosa, o con dificultad |
| 27 O O O Indigestión después de las comidas | 82 O O O Aprensivo, se siente inseguro(a) |
| 28 OOO Siempre está con hambre, se siente "mareado" frecuentemente | 83 O O O Se siente nauseabundo, cefalea alrededor de los ojos |
| 29 O O O Digestión rápida | 84 O O O Malestar con alimentos grasosos |
| 30 O O O Vomita frecuentemente 31 O O O Ronquedad frecuente | 85 O O O Heces de color claro 86 O O O La piel en la planta del pie se descascara |
| 32 O O O Respiración irregular | 87 O O O Dolor entre el omoplato |
| 33 O O O Pulso lento, se siente "irregular" | 88 O O O Usa laxantes |
| 34 O O O Nauseas, reflejos lentos | 89 O O O Las heces cambian de blandas a líquidas |
| 35 0 0 0 Dificultad en tragar | 90 O O O Antecedentes de ataques de vesícula biliar o cálculos biliares |
| 36 O O O Estreñimiento, diarrea alternada 37 O O O "Es lento al inicio de algo" | 91 O O O Ataques de estornudo 92 O O O Sueños con pesadillas |
| 38 O O O No siente escalofríos con frecuencia | 93 O O O Mal aliento (halitosis) |
| 39 O O O Suda fácilmente | 94 O O O Los productos lácteos le producen malestar |
| 40 O O Circulación deficiente, sensible al frío | 95 O O O Sensible a las temperaturas calientes |
| 41 O O O Sujeto a resfriados, asma y bronquitis | 96 O O O Quemazón o escozor en el recto 97 O O O Tiene deseos de dulces |
| GRUPO 3 | |
| 42 O O O Come cuando está nervioso(a) 43 O O O Apetito excesivo | GRUPO 6 98 O O O No degusta de la carne |
| 44 OOO Le da hambre entre las comidas | 99 O O O Gases intestinales horas después de haber comido |
| 45 O O O Irritable antes de las comidas | 100 O O O Sensación de irritación en el estómago, se alivia después |
| 46 O O O Le da "temblores" si está hambriento(a) | de haber comido |
| 47 OOO Fatiga, se calma cuando come 48 OOO Le da "mareo" si las comidas se demoran | 101 O O O Lengua saburral 102 O O O Tiene flatulencia, ventosidades hediondas frecuentes |
| 49 O O O Siente palpitaciones si las comidas se demoran o las deja pasar | 103 O O O Indigestión ½ a 1 hora después de las comidas; puede |
| 50 OOO Dolores de cabeza en las tardes | permanecer por 3 a 4 horas |
| 51 O O O Malestar después de comer dulces en exceso | 104 O O O Colitis mucosa o "inflamación del colon" |
| 52 O O O Se despierta después de unas horas de sueño tiene | 105 O O O Gases después de las comidas |
| dificultad en volverse a dormir | 106 O O O "Distensión estomacal" después de las comidas |

| 1 2 3 GRUPO 7A | 1 2 3 |
|--|--|
| 107 O O O Insomnio | 170 O O O Debilidad después de los resfriados, influenza |
| 108 O O O Nerviosidad | 171 OOO Agotamiento- muscular y nervioso |
| 109 O O O No puede subir de peso | 172 O O O Trastornos respiratorios |
| 110 OOO Intolerancia al calor | GRUPO 8 |
| 111 O O O Sumamente emocional | 173 OOO Aprensión |
| 112 OOO Se sofoca fácilmente | 174 O O O Irritabilidad |
| 113 O O O Sudores nocturnos | 175 O O O Temores mórbidos |
| 114 OOO Piel delgada, hidratada | 176 O O O Parece nunca mejorarse |
| 115 O O O Temblores internos | 177 O O O Olvido, falta de memoria |
| 116 O O O Palpitaciones del corazón | 178 OOO Indigestión |
| 117 O O O Aumento de apetito sin aumentar peso | 179 O O O Falta de apetito |
| 118 OOO El pulso ligero al reposar | 180 O O O Deseos de dulces |
| 119 O O O Contracción nerviosa de los párpados y cara | 181 O O O Dolencias musculares |
| 120 O O O Irritable e inquieto | 182 O O O Depresión, sentimientos de miedo |
| 121 OOO No puede trabajar bajo presión | 183 O O O Sensibilidad al ruido |
| GRUPO 7B | 184 O O O Alucinaciones acústicas |
| 122 0 0 0 Aumento de peso | 185 O O O Tendencia al llanto sin razón |
| 123 O O O Disminución de apetito | 186 O O O El cabello es grueso y/o ralo |
| 124 O O O Se fatiga fácilmente | 187 O O O Debilidad |
| 125 O O O Le zumban los oídos | 188 0 0 0 Fatiga |
| 126 O O O Adormecido durante el día | 3 |
| | 189 O O O La piel es sensible al contacto |
| 127 O O O Sensible al frío | 190 O O O Tendencia a la urticaria |
| 128 O O O Piel seca o áspera | 191 O O O Nerviosidad |
| 129 O O O Estreñimiento | 192 O O O Dolores de cabeza |
| 130 O O O Inercia mental | 193 O O O Insomnio |
| 131 O O O Cabello grueso, se cae | 194 O O O Ansiedad |
| 132 O O O Dolores de cabeza al levantarse, se disipan durante el día | 195 O O O Anorexia |
| 133 O O O Pulso lento, menos de 65 | 196 O O O Incapacidad para concentrarse, confusión |
| 134 O O O Frecuencia de micción | 197 O O O Nariz tapada frecuentemente, infecciones de sinusitis |
| 135 O O O Hipoacusia (disminución de la sensibilidad a los sonidos) | 198 O O O Alergia a algunos alimentos |
| 136 O O O Disminución de iniciativa | 199 O O O Músculos débiles |
| GRUPO 7C | MUJERES SOLAMENTE |
| 137 O O O Falta de memoria | 200 OOO Se fatiga muy fácilmente |
| 138 O O O Tensión arterial baja | 201 O O O Tensión premenstrual |
| 139 O O O Aumento del libido | 202 O O O Menstruación dolorosa |
| 140 O O O Dolores de cabeza o "cefalea intensísima" | 203 O O O Sentimientos de depresión antes de la menstruación |
| 141 O O O Disminución de tolerancia al azúcar | 204 O O O Menstruación excesiva y prolongada |
| | 205 O O O Senos doloridos |
| GRUPO 7D | 206 O O O Menstrua con frecuencia |
| 142 O O O Sed anormal | 207 O O Flujo vaginal |
| 143 O O O Distensión del abdomen | 208 O Histerectomía/extirpación de los ovarios |
| 144 O O O Aumento de peso alrededor de las caderas y cintura | 209 O O O Sofocos (de la menopausia) |
| 145 O O O Disminución o falta de la libido (deseo sexual) | 210 O O O Menstruación escasa o amenorrea (ausencia) |
| 146 O O O Tendencia a úlceras, colitis | , |
| 147 O O O Aumento de tolerancia al azúcar | 211 0 0 0 Acné, peor durante el menstruo |
| 148 O O O Mujeres: trastornos menstruales | 212 O O O Depresión de largo tiempo |
| 149 OOO Jovencitas: Falta de función menstrual | HOMBRE SOLAMENTE |
| GRUPO 7E | 213 O O O Problemas con la próstata |
| 150 O O O Mareos | 214 O O O Dificultad en orinar o micción en chorro |
| 151 O O O Dolores de cabeza | 215 O O O Frecuencia de micción en la noche |
| 152 O O O Sofocos | 216 O O O Depresión |
| 153 O O O Aumento tensión arterial | 217 O O O Dolor dentro de las piernas o talones |
| 154 O O O Crecimiento de vello en la cara o cuerpo (mujer) | 218 O O O Sentido de evacuación del intestino incompleta |
| 155 O O O Glucosuria en la orina (no diabetes) | 219 OOO Falta de energía |
| 156 O O O Tendencias masculinas (en la mujer) | 220 O O O Dolencias y molestias migratorias |
| GRUPO 7F | 221 OOO Se cansa fácilmente |
| 157 O O O Debilidad, vértigo o mareo | 222 OOO Evita la actividad |
| 158 O O O Fatiga crónica | 223 O O O Impulso nervioso en la pierna en la noche |
| 159 O O O Tensión arterial baja | 224 O O O Disminución de la libido |
| 160 O O Uñas débiles, con surcos | |
| 161 O O O Tendencia a la urticaria | Enumere los cinco padecimientos que tiene en orden de importancia: |
| | 1 |
| 162 O O O Tendencia a la artritis | ·· · |
| 163 O O O Aumento de sudoración | 2 |
| 164 0 0 0 Trastornos intestinales | |
| 165 O O Circulación deficiente | 3 |
| 166 O O O Tobillos hinchados | |
| 167 O O O Deseo de sal | 4 |
| 168 O O O Manchas pardas o bronceado de la piel | |
| 169 OOO Alergias-tendencia al asma | 5 |